

Динамика на заболяемостта от грип и ОРЗ, базирана на данните от Сентинелната система за епидемиологичен надзор на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) - Русе

Броят на наблюдаваните лица при сентинелния надзор на грип и ОРЗ е 10% от населението на областния град, като лицата са разпределени в 5 възрастови групи (0-4 г., 5-14 г., 15-29 г., 30-64 г. и над 65 г.) при спазване на възрастовата структура на населението.

За сезона 2024/2025 г. със заповед на Директора на РЗИ-Русе са определени 5 ОПЛ на територията на гр. Русе. В периода 01.11.2024 – 31.03.2025 г. те съобщават ежедневно в РЗИ-Русе броя на регистрираните случаи на грип и ОРЗ, разпределени по посочените възрастови групи. Заболяемостта от грип и ОРЗ се изчислява на 10 000 души.

Регистрираната заболяемост в област Русе според данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ през седмица №4 (от 20.01.2025 г. до 26.01.2025 г.) е **155.83 на 10 000**. Наблюдава се повишаване на общото ниво спрямо данните от седмица №3 (от 13.01.2025 г. до 19.01.2025 г.). Регистрираната заболяемост достигна високи стойности, епидемичният процес е в подем.

Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., като стойностите спрямо седмица №3 (от 13.01.2025 г. до 19.01.2025 г.) се повишават. Във възрастови групи 0-4 г., 15-29 г., 30-64 г. и над 65 години също се отчита повишаване на стойностите на заболяемостта през седмица №4 (от 20.01.2025 г. до 26.01.2025 г.).

От началото на годината до 24.01.2025 г. от изпратените в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ са доказани общо 5 положителни резултата за грипни вируси по метода Real-Time RT-PCR, от които тип А (H1N1) – 4 и А (H3N2) – 1. Пробите са взети от пациенти със симптоми на остри респираторни инфекции от сентинелните практики в гр. Русе.

Съгласно указанията на МЗ и НЦЗПБ, за периода от 01.11.2024 до 31.03.2025 г. РЗИ въвежда данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ ежедневно.

Препоръчително е спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилаганеното на „респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др. С цел намаляване разпространението на грип и ОРЗ лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си, вкл. да не посещават работното си място. Тези мерки са ефективни, както за предпазване от грип и ОРЗ, така и от COVID-19 и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път.

Ваксинацията срещу грип остава най-сигурният начин да се предпазим от тежко боледуване, хоспитализация и дългосрочни последици за здравето.

Една от целите на **Националната програма за подобряване на ваксинационната профилактика срещу сезонен грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години (2023-2026 г.)** е намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст.