



## Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

Възрастови групи	Основна имунизация				Бустерна доза	
	Първа доза	Втора доза	Вид ваксина	Интервал между двете дози (в седмици)	Бустер	Интервал между завършен ваксинационен курс и бустер
5 - 11 г., вкл.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Не се поставя	-
6-11 г., вкл.	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Не се поставя	-
12 - 17 г., вкл.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty	Най-малко 6 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Comirnaty	Най-малко 6 м.
≥ 18 г.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty / Spikevax	Най-малко 3 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Spikevax / Comirnaty	Най-малко 3 м.
	Vaxzevria	Vaxzevria	векторна	4-12	Comirnaty	Най-малко 3 м.
	Vaxzevria	Vaxzevria	векторна	4-12	Spikevax	Най-малко 3 м.
	Janssen	-	векторна	-	Comirnaty	Най-малко 3 м.
	Janssen	-	векторна	-	Janssen	Най-малко 2 м.
	Janssen	-	векторна	-	Spikevax	Най-малко 3 м.
	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	COVID-19 Vaccine Janssen	Най-малко 3 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	COVID-19 Vaccine Janssen	Най-малко 3 м.
	Vaxzevria	Comirnaty	Схема на хетероложна ваксинация	≥ 12	Comirnaty	Най-малко 3 м.
*Бременни жени	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty / Spikevax	Най-малко 3 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Spikevax / Comirnaty	Най-малко 3 м.

\*Препоръката на Експертния съвет по акушерство и гинекология е бременните жени да се ваксинират след 12 г. с. с иРНК ваксина. Това се отнася и за поставянето на бустерна ваксина.

\*\* На лица, които са тежко имунокомпрометирани (вкл. деца над 5 г.), трета (подсилваща) доза иРНК ваксина може да се приложи най-малко 28 дни след втората доза, по преценка на лекар.

\*\*\* Таблицата е изготвена съгласно препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката и кратките характеристики на посочените ваксини срещу COVID-19.

Полезна информация за ваксините  
и ваксинацията можете да намерите тук:

[www.плюсмен.бг](http://www.плюсмен.бг)

